ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N 283

N° 96.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Observation

Sur une fille dont les Règles sortent tous les Mois par le Pouce, avec des Moyens proposés pour les rappeller par les Voyes ordinaires.

Une fille âgée de 23 ans, d'un temperament sanguin est venue me consulter il y a quelques jours; Elle me dit, que ses Règles l'on prises dès l'âge de onze ans sans aucun accident, qu'elle a toujours été bien réglée jusqu'à 20 ans, ayant toujours joui d'une parfaite santé. Elle a actuellement 23 ans.

Il y a trois ans qu'elle fut attaquée d'un Panaris au Pouce de la Main droite, avec un gonflement dans tout le bras jusque sous l'aisselle. Ce gonflement cessa immediattement après l'ouverture que l'on fit du Panaris. N'ayant point vu cette fille dans ce tems je ne sçai de quelle espèce étoit ce Panaris; Il ne paroit pas avoir eu son siège dans la ~~[illegible]~~ gaine du tendon, les mouvemens de flexion et d'extention des falanges du pouce se faisant librement. Depuis cette ouverture ses Règles se sont supprimées. Ce Pouce a été pansé pendant six mois sans qu'on ai pût y former une bonne cicatrice; cequi détermina, a cequi dit cette fille, de faire une seconde insision à la partie interne. Cette seconde plaie s'est cicatrisée, mais à la première il est toujours resté deux petites ouvertures près la racine de l'ongle qui n'ont jamais pû se cicatriser.

Cinq à six mois après la seconde insision, environ un an après la cessation des Règles, tous les mois, le ventre se gonflott considerablement avec des douleurs dans les Reins, cequi étoit suivi de suffocations; le gonflement s'étendoit sur le milieu

ARC 50 n° 117

du dos et au bras du Côté du Panaris; tous ces accidens se terminoient par un vomissement de Sang qui prenoit tous les jours cinq à six fois pendant trois à quatre jours. Au moyen de cette évacuation sanguine, la tention du ventre, le gonflement des autres parties, la suffocation et la douleur disparoissoient. Tous les mois ces accidens se renouvellaient et se terminoient toujours par le vomissement de Sang. Cette Evacuation Périodique par le vomissement a continué quatre à cinq mois.

Les Saignées du bras et du Pied et tous les remedes propres a d'appeler les Régles, ont étés inutilement mis en usage. Enfin, le vomissement de Sang a cessé parceque l'évacuation périodique a pris son cours par les deux petites ouvertures situées à la ~~racine~~ de l'Ongle, qui n'avoient pû jusqu'à l'ors se cicatriser.

Depuis ce moment, tous les mois, le ventre se gonfle considérablement de maniere qu'on prendroit cette fille pour une femme grosse; avec des douleurs dans le ventre et dans les Reins. Ce gonflement gâgne le dos, l'épaule et le bras, du côté des ouvertures, jusqu'au bout des Doigts, accompagné de grandes douleurs dans toutes ces parties. Ce gonflement se fait par gradation sur ces differentes parties pendant trois jours; Celui du Dos succéde à celui du Ventre, et celui du bras à Celui du Dos, et le quatrième jour le sang s'écoule abondament par les deux petites ouvertures de la racine de l'Ongle, et cet écoulement continue pendant sept à huit

jours. amesure que le sang sort, le gonflement et la douleur diminuent d'autant. Le neuvième jour, le sang cesse de couler, le ventre, le dos, l'épaule et le bras reviennent dans leur situations et proportions naturelles. C'est ainsi que depuis près de deux ans la Matière des Régles prend sa Route par le Pouce.

~~Un gran~~ Tous les Médecins de cette Ville ont étés consultés par cette fille; on a employé un grand nombre de remedes pour rappeler cette évacuation Périodique par les voyent ordinaires, elle a été saignée depuis 3 ans plus de 100 fois, et tout cela sans aucun Succès.

Quand l'économie animale, cequ'on appelle communement la Nature, détermine une évacuation périodique, comme celle des Régles, par toute autre voye que celle qui lui est destinée à lui livrer passage, on a beaucoup de peine a rappeller cette évacuation pour la remettre dans sa route ordinaire. Il semble que les Issues naturelles par où doit s'échaper cette évacuation se soient fermés et que dela dépend le reflux du sang qui se porte vers les parties qui lui opposent moins de resistence. C'est cequi est arrivé à cette fille. Les vaisseaux dela matrice qui doivent donner passage à la matière des Régles se sont resserrés demanière qu'ils ne peuvent plus s'ouvrir pour donner passage au Sang menstruelle. Dans ce Cas le sang est obligé de refluer vers les parties supérieures. Dans les premiers tems il se déposoit dans l'estomac; dela s'en suivoit les vomissemens de Sang. Enfin, ce sang pressé detoute part, trouvant moins de résistance du côté du Pouce qui lui livroit un passage plus libre, a pris sa route par ce pouce, et sort périodiquement tous les mois par les deux petites ouvertures qu'on y remarquent. Cette évacuation Périodique est très réglée et ne manque jamais

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

d'un jour.

La p.re indication qu'on doit avoir dans le traitement de cette maladie est de détendre, ouvrir ou desserrer les vaisseaux de la Matrice. L'usage des demi-bains, administrés pendant 5 à 6 jours, en les commençant 8 jours avant que les p.rs symptômes de l'évacuation se font sentir, pourroit remplir cette p.re indication.

La 2.d est d'ouvrir ~~un issus au sang le plus près de la Matrice qu'il est possible, et de procurer par cet issus une évacuation sanguine;~~ et de procurer cette évacuation la veille ou le jour que les premiers symptômes de l'évacuation périodique doivent se manifester.

Dans le tems de l'évacuation périodique, le sang qui se porte d'abord à la Matrice trouvant les vaisseaux détendus, s'y insinuera avec plus de facilité; l'issus qu'on lui ouvrira procurera une évacuation, et empeschera ce sang de se porter vers les parties supérieures. De cette opération il doit s'ensuivre nécessairement la cessation de tous les accidens.

Il est donc question de choisir le lieu où l'on doit ouvrir un passage au sang; je n'en voit pas de plus convenable que la circonférence de l'anus, où les extrémitées capillaires des veines hémorrhoïdales aboutissent.

En appliquant des sangsues autour de l'anus, les extrémitées de veines hémorrhoïdales seront ouvertes, et le sang sera pompé par ces petits animaux; d'où s'en suivra une évacuation qui déterminera le sang à couler vers cet endroit qui lui opposera moins de résistance, et qui l'empeschera par une suitte nécessaire, de se porter vers les parties supérieures.

L'écoulement du sang hémorrhoïdale doit dégorger nécessairement les vaisseaux de la Matrice, parceque les rameaux de la veine hémorrhoïdale externe qui se distribuent à l'anus ne sont autre chose que des productions de la veine hypogastrique qui se distribuë au corps de la Matrice. De même les extrémitées

capillaires delaveine hémorrhoïdale interne, ou petite Mésaraïque, qui se distribuent àl'Anus communiquent par des ramifications capillaires avec laveine hémorrhoïdale externe.

Si dans le tems quele sang se porte à la Matrice pour y être — évacué comme un superflu, on ouvre en même tems les veines hémorrhoïdales avec les sangsues, pour procurer une évacuation sanguine, amésure quele sang s'écoulera les vaisseaux de la Matrice se dégorgeront, et ce sang ne se portera pas vers les parties supérieures. D'ailleurs, le dégorgement ou la détente des vaisseaux dela matrice, et l'écoulement du sang par les — veines hémorrhoïdales peuvent bien rapeller l'évacuation périodique par les voyes ordinaires, comme je me persuade que quelques Praticiens l'ont observé.

Il faut donc, laveille ou le jour que les symptômes de — l'évacuation périodique se font sentir, appliquer à la — circonference del'anus trois ou quatre sangsues, les laisser quitter d'elles mêmes, et faire mettre la malade dans un — demi-bain, afin de procurer la sortie du sang et autirer par ce moyen trois a quatre pallettes, ou moins, si — les forces dela malades ne permettroient pas d'en tirer cette — quantité.

On demande si au moyen de cette conduite on peut empescher le retoure périodique des accidens, et rappeller les Regles par la voye ~~[illegible]~~ ordinaire.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE